

ICTHIOVAC[®]-TM

Vacuna inactivada,
Tenacibaculosis rodaballos,
en suspensión inyectable

COMPOSICIÓN POR DOSIS:

Tenacibaculum maritimum LPV 1.7 inactivado serotipo 02 RPS* \geq 75%.

* RPS: Porcentaje Relativo de Supervivencia.

INDICACIONES:

Rodaballos: Prevención de la Tenacibaculosis producida por *Tenacibaculum maritimum*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intraperitoneal.

- Agitar antes de usar.
- La vacuna debe ser utilizada inmediatamente después de su apertura.

POSOLOGÍA:

Rodaballos: 1 ds (0,1 ml)/pez. La talla mínima de vacunación es de 20 a 30 g.

- El establecimiento de la inmunidad es a los 28 días después de la vacunación, y la duración de la inmunidad conferida es de 6 meses.

TIEMPO DE ESPERA:

Cero grados-día.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Los peces no deben ser sometidos a ningún estrés durante los 4 ó 5 días anteriores y 15 días siguientes a la vacunación.
- No vacunar peces enfermos o portadores de algún microorganismo patógeno.
- La temperatura de vacunación debe ser igual o ligeramente inferior a la temperatura óptima de cultivo.
- Guardar entre +2 y +8 °C, evitando su posible congelación.

PRESENTACIÓN:

Botella 5.000 ds.

Prescripción veterinaria

