

# MYPRAVAC<sup>®</sup> SUIS

## Vacuna inactivada, Neumonía enzoótica, en suspensión inyectable

### COMPOSICIÓN POR DOSIS:

*Mycoplasma hyopneumoniae* inactivado cepa J  $\geq 1,0$  DE<sub>80</sub> cobayo. Adyuvante idóneo.

### INDICACIONES:

**Porcinos:** Prevención de la Neumonía enzoótica.

### EFFECTOS SECUNDARIOS:

- Puede aparecer una reacción anafiláctica esporádica en algún animal sensibilizado. En este caso, administrar un antihistamínico.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular, en los músculos del cuello.

- Administrar la vacuna cuando esté a temperatura ambiente de unos +15 a +25 °C.
- Agitar antes de usar.

### POSOLOGÍA:

**Porcinos:** 2 ml/lechón, a partir de los 7 días de edad.

- En general, es aconsejable el siguiente programa vacunal orientativo:  
Vacunación inicial a partir de los 7 días de edad. Revacunar 21 días después.

### TIEMPO DE ESPERA:

*Carne:* 2 días.

### PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Guardar entre +2 y +8 °C, evitando su posible congelación.

### PRESENTACIÓN:

Frasco 50 ds.

Prescripción veterinaria

