

# ICTHIOVAC<sup>®</sup>-STR

Vacuna inactivada,  
Estreptococosis rodaballos,  
en suspensión inyectable

## COMPOSICIÓN POR DOSIS:

*Streptococcus parauberis* inactivado cepa RA-99.1 RPS\*  $\geq$  75%; *Streptococcus parauberis* inactivado cepa AZ-12.1 RPS\*  $\geq$  75%.

\* RPS: Porcentaje Relativo de Supervivencia.

## INDICACIONES:

**Rodaballos:** Prevención de la Estreptococosis producida por *Streptococcus parauberis*.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intraperitoneal.

- Agitar antes de usar.
- Una vez abierta la botella, su contenido debe utilizarse el mismo día.

## POSOLOGÍA:

**Rodaballos:** 1 ds (0,1 ml)/pez.

- Una sola dosis administrada entre los 30-40 g protege durante todo el ciclo de producción.

## TIEMPO DE ESPERA:

Cero grados-día.

## PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Los peces no deben ser sometidos a estrés durante las 48 horas previas a la vacunación, ni durante los 15 días siguientes a la misma.
- No vacunar peces enfermos o portadores de algún microorganismo patógeno.
- La temperatura del agua de cultivo durante la vacunación debe ser igual o ligeramente inferior a la temperatura óptima de cultivo de la especie.
- Guardar entre +2 y +8 °C, evitando su posible congelación.

## PRESENTACIÓN:

Botella 5.000 ds.

Prescripción veterinaria

