

ICTHIOVAC[®]-LG

Vacuna inactivada,
Lactococosis truchas,
en emulsión inyectable

COMPOSICIÓN POR DOSIS:

Lactococcus garvieae inactivado cepa TW-446.B3 RPS* \geq 75%. Adyuvante oleoso.

* RPS: Porcentaje Relativo de Supervivencia.

INDICACIONES:

Truchas: Prevención de la Lactococosis producida por *Lactococcus garvieae*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intraperitoneal.

- Agitar antes de usar.
- Una vez abierta la botella, su contenido debe utilizarse el mismo día.

POSOLOGÍA:

Truchas: 1 ds (0,1 ml)/pez. Talla: a partir de los 20 g.

- La vacunación de los peces a los 20 g proporciona inmunidad desde los 28 días después de la administración hasta los 8 meses de la misma.

TIEMPO DE ESPERA:

Cero grados-día.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Los peces no deben ser sometidos a estrés durante las 48 horas previas a la vacunación, ni durante los 15 días siguientes a la misma.
- No vacunar peces enfermos o portadores de algún microorganismo patógeno.
- La temperatura del agua de cultivo durante la vacunación debe ser igual o ligeramente inferior a la temperatura óptima de cultivo de la especie.
- Guardar entre +2 y +8 °C, evitando su posible congelación.

PRESENTACIÓN:

Botella 5.000 ds.

Prescripción veterinaria

